

Note préliminaire sur la révision des mégaspores à gula du carbonifère. Les principes de la classification

Sonia Dybova-Jachowicz, Aleksander Jachowicz, Jadwiga Karczewska, Georges Lachkar, Stanislas Loboziak, Pierre Pérart, Elżbieta Turnau, Zofia Żołądani
Acta Palaeontologica Polonica 24 (4), 1979: 411-422

Dans ce travail, sont donnés les principes adoptés par le Groupe de travail de la C.I.M.P. réuni à Kozubnik en septembre 1976, pour la classification et la nomenclature des mégaspores à gula du carbonifère. Quatre types de gula sont distingués: hologula, subgula, anguligula et crassigula. De nouveaux genres, à savoir *Sublagenicula*, *Auritolagenicula* et *Crassilagenicula*, sont proposés aux dépens des *Lagenicula* et *Lagenoisporites* dont l'importance est réduite. Le genre *zonotagentcuta* est créé pour ranger les mégaspores qui présentent une proéminence apicale et une formation équatoriale.

Key words: Les mégaspores, Carbonifère, Palynologie, Classification.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (for details please see creativecommons.org), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.