

## Gatunek typowy rodzaju *Cyrtosymbole* a najstarsze (fameńskie) trylobity z podrodziny Cyrtosymbolinae

Raimund Feist and Rudy Lerosey-Aubril

*Acta Palaeontologica Polonica* 50 (3), 2005: 465-475

Dokonano redeskrypcji słabo dotąd znanego gatunku typowego rodzaju *Cyrtosymbole*, tj. *Dechenella escoti* na podstawie obfitego nowego materiału z wczesnofameńskiej dolnej formacji wapieni z Griotte w La Touriere, koło Cabrières na południu Francji. Obejmuje on skłeryty (hipostom, policzki ruchome, człony tułowiowe i zewnętrzną powierzchnię tarczy ogonowej) które dotąd były nieznane lub reprezentowane przez słabo zachowane i niekompletne okazy. Dysponujemy też kompletem stadiów rozwojowych starszych niż protaspis. Ten ostatni materiał pozwolił wykazać, że niektóre cechy, zwłaszcza w okolicy przed glabellą, oraz szwów za oczami, bardzo się zmienia między wczesnymi a późnymi stadiami holaspis. Dawniej niektóre gatunki ustanawiano na podstawie osobników młodocianych, np. lektotyp *C. escoti* to wczesny holaspis, i jego cechy uznano za diagnostyczne dla rodzaju *Cyrtosymbole*. Wiarygodne oznaczanie gatunków w obrębie Cyrtosymbolinae wymaga więc dysponowania odpowiednim materiałem, w tym późnym stadium holaspids. Podano zrewidowaną diagnozę *Cyrtosymbole*, i zaliczono do tego rodzaju tylko te trylobity, które mają wspólne cechy diagnostyczne z *C. escoti* w stadium dorosłym. Wgląd we wczesne stadia rozwoju osobniczego u *C. escoti* i jego krewniaków wspiera zaliczenie Cyrtosymbolinae do Proetidae.

**Key words:** Trilobita, Proetidae, Cyrtosymbolinae, ontogeny, Devonian, Famennian.

Raimund Feist [[rfeist@isem.univ-montp2.fr](mailto:rfeist@isem.univ-montp2.fr)] and Rudy Lerosey-Aubril [[lerosey@isem.univ-montp2.fr](mailto:lerosey@isem.univ-montp2.fr)], Laboratoire de Paléontologie, Paléobiologie et Phylogénie, Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier, 34095 Montpellier Cedex 05, France.



[Full text \(481.2 kB\)](#)